

Tableau 1

Lachman	Cooperman 1990	arthroscopie	0,69	0,55	1,53	0,56
	Bejaminse 2006	arthroscopie	0,85	0,94	14,17	0,16
	Décary 2017 (Solomon 2001)	arthroscopie ou IRM	0,84	1		0,16
	Décary 2017 (Jackson 2003)	arthroscopie ou IRM, radiographie, diagnostic clinique	0,87	0,93	12,43	0,14
	Décary 2017 (Scholten 2003)	arthroscopie ou IRM	0,86	0,91	9,56	0,15
	Décary 2017 (van Eck 2013)	arthroscopie ou IRM	0,81	0,81	4,26	0,23
	Lichtenberg 2018	arthroscopie	0,87	0,91	9,67	0,14
	Sokal 2022	lésion isolée du LCA	0,81	0,85	5,40	0,22
Test du levier (Lelli's test)	Lichtenberg 2018	arthroscopie	0,39	1		0,61
	Sokal 2022	lésion isolée du LCA	0,83	0,91	9,22	0,19
cumulé avec Lachman, pivot shift test et tiroir antérieur	Lichtenberg 2018	arthroscopie	0,91	0,91	10,11	0,10
Lachman, pivot shift test et tiroir antérieur seuls	Lichtenberg 2018	arthroscopie	0,88	0,91	9,78	0,13
Pivot Shift Test	Benjaminse 2006	arthroscopie, arthrotomie ou IRM	0,24	0,98	12,00	0,78
	Décary 2017 (Jackson 2003)	arthroscopie ou IRM, radiographie, diagnostic clinique	0,61	0,97	20,33	0,40
	Décary 2017 (van Eck 2013)	arthroscopie ou IRM	0,28	0,81	1,47	0,89
	Sokal 2022	lésion isolée du LCA	0,55	0,94	9,17	0,48